Brit.) représente (tabl. 56) et décrit sommairement (p. 80) n'a rien de commun avec le *Cirsium lanceolatum* de Scop. Le binôme *Cirsium lanceolatum* a été attribué par Hill à un type totalement distinct du *Carduus lanceolatus* L. ; il ne peut donc être conservé pour désigner cette dernière plante (transposée dans le genre *Cirsium*), parce que « homonyme d'un nom antérieur fondé sur un type différent » (art. 61 des Règles de la Nomenclature).

3. Savi a utilisé dès 1798 (in Fl. pis. II, 241), dans le genre *Carduus*, l'épithète *vulgaris* pour désigner le *Carduus lanceolatus* L. ; c'est Tenore qui le premier, en 1835-36 (in Fl. nap. V., 209) a transposé dans le genre *Cirsium*, sous le nom de *Cirsium vulgare*, cette espèce linnéenne pour laquelle il convient d'adopter définitivement la combinaison *Cirsium vulgare* (Savi) Tenore.

4. Telle que je l'avais établie en 1945, la synonymie de l'espèce (*sensu lato*) devra subir par suite quelques retouches ainsi que, partiellement, la nomenclature. En particulier, il ne me semble ni possible ni logique de conserver le nom de Subsp. *eu-lanceolatum* à la première sous-espèce en rejetant dans la synonymie pour l'espèce, l'épithète *lanceolatum* et je pense qu'il sera à la fois correct et rationnel de distinguer désormais ce premier groupe subspécifique sous le nom de Subsp. *Savianum* J. Ar.

UNE EUPHORBE NOUVELLE CURIEUSE DE MADAGASCAR

par J. LEANDRI

Euphorbia Salota spec. nov.

Frutex circiter 2-metralis, habitu Genistae scopariae vel Spartio junceo similis. Rami teretes, fusci ; ramuli multi, erecti, dilute virides, complanati (circiter 2 mm. lati, 1 mm. crassi) in sicco in longum striati. Folia alterna, 2-3 cm. distantia. Stipulae inconspicuae. Petiolus brevissimus. Lamina linearis, acuta, vel oblongo-obovata, apice rotundata subcar-

nosa (?), nervis obsoletis, 1-3 cm. longa, 1-10 mm. lata. Cyathia, unisexualia, ♀ subhemisphaericis solitariis terminalibus, nonnunquam geminatis vel uno in axilla folii apicalis, circiter 2 mm. longis, 2 mm. latis ; ♂ tronconicis, 2-3 apice ramulorum et in axillis foliorum apicalium, circiter 3 mm. longis et latis. Cyathii ♀ pedunculus torquellos urceolares 2-3 prominentes superpositos, cyathophylla ± coalita figurantes gerens. Cyathii ♂ pedunculus brevissimus et torquello urceolari unico munitus. Glandulae 5 reniformes apice intra inflatae. Bracteae 3-5, ovatae, apice fimbriatae, multo tenuiores. Cyathium ♂ stamina 7-8 diverse longa continens simul ac corpus centrale apice inflatum floris ♀ rudimentum figurans, fascias verticales 4-5 alte laciniatas et lacinias simplices plures. Cyathium ♀ staminodia parva 1-2 et florem ♀ unicum continens ; pedicello cyathio longiore ; calyce ovario minus longo, sinuato-dentato ; loculis 3 ellipsoideo-oblongis circiter 2 mm. altis, stigmatibus usque ad medium divisis, basi inflatis. Fructus maturus coccae 3 tenues, media parte interna coalitae, circiter 5 mm. longae, 6 mm. latae, calyce stigmatibusque persistentibus, valvis 6 dehiscentes. Semen 3 mm. longum , 2 mm. latum, ovato-apiculatum dorso variegatum, ventro cicatrice alba transversa subapicali et sulco mediano longitudinali notatum.

Il existe en Afrique australe un *Euphorbia genistoides*, mais dont l'inflorescence est toute différente. Le port de l'*E. Salota* rappelle aussi l'*E. Guyoniana* Boiss. et Reut., mais les cyathophylles et les caractères floraux sont différents.

Plante croissant sur les rocailles gneissiques ; floraison et fructification : décembre-mars (?).

MADAGASCAR : CENTRE (Ouest) : Vallée de la Manambolo, rive droite (bassin du Mandrare) aux environs d'Isomono (confluent de la Sakamalio), mont Morahariva, alt. 1.000 m., *Humbert* 13.132. — Mont Eromo, près Beraketa, entre Isoanala et Antanimoro (Sud), gneiss, alt. 800-1.000 m., *Humbert* 14.190.

Nom vernaculaire (antandroy) ; *Salota*.